

Подготовка к ФГДС

Подготовка для ФГДС: голод не менее 8 часов.

***На процедуру принести направление и полотенце.**

Подготовка к колоноскопии

На процедуру принести ПРОСТЫНЬ!

Рекомендуем Вам выбрать следующий из представленных способов для подготовки к данному исследованию:

Подготовка к колоноскопии препаратом Фортранс:

- последний прием пищи закончить сегодня до 13:00
- прием раствора Фортранса начать в 16:00
- с 16:00 до 17:00 принять первый литр раствора Фортранса
- с 17:00 до 18:00 принять второй литр раствора Фортранса
- с 18:00 до 19:00 принять третий литр раствора Фортранса
- с 19:00 до 20:00 принять четвертый литр раствора Фортранса.

Подготовка к колоноскопии препаратом ЭЗИКЛЕН

Пункт 1. Вечером накануне обследования (в 18:00) содержимое 1-го флакона растворить в 0,5 литра воды, далее в течении 2 часов выпить данный раствор + 1 литр воды.

Пункт 2 . Утром в день процедуры повторить действия пункта 1. С расчетом, что прием препарата должен быть закончен минимум за 2 часа до обследования.

Подготовка к колоноскопии препаратом Фосфо-сода

В день до обследования в 7 утра вместо завтрака выпить 1 стакан «легкой» жидкости (бульон, сок без мякоти, чай, кофе, вода).

Сразу после выпить ПЕРВУЮ дозу раствора: 1 флакон (45 мл) фосфо-сода в 120 мл холодной воды. Раствор запить 2 стаканами холодной воды.

В 13 часов вместо обеда выпить 3 стакана «легкой» жидкости (бульон, сок без мякоти, чай, кофе, вода).

Вместо ужина в 19:00 выпить 1 стакан «легкой» жидкости (бульон, сок без мякоти, чай, кофе, вода).

Сразу после выпить ВТОРУЮ дозу раствора: 1 флакон (45 мл) фосфо-сода в 120 мл холодной воды. Раствор запить 2 стаканами холодной воды.

При желании воду можно пить вплоть до полуночи по необходимости.

Подготовка к колоноскопии препаратом Фортранс

- последний прием пищи закончить сегодня до 13:00
- прием раствора Фортранса начать в 16:00
- с 16:00 до 17:00 принять первый литр раствора Фортранса
- с 17:00 до 18:00 принять второй литр раствора Фортранса
- с 18:00 до 19:00 принять третий литр раствора Фортранса
- с 19:00 до 20:00 принять четвертый литр раствора Фортранса.

Подготовка к колоноскопии препаратом Пикопреп

- последний прием пищи закончить сегодня в 14:00
- первый этап с 14:00 до 18:00: 1 порошок растворить в 150 мл воды (размешивать 2 минуты) после выпить 5 стаканов воды за 2-3 часа.
- второй этап с 22:00 до 24:00: 1 порошок растворить в 150 мл воды (размешивать 2 минуты) после выпить 3 стакана воды за 2-3 часа.

Подготовка к колоноскопии препаратом Фосфо-сода

Пункт 1. Вечером накануне процедуры (в 18:00) содержимое 1 флакона растворить в 0,5 литра воды, далее в течении 2 часов выпить данный раствор + 1 литр воды.

Пункт 2 . Утром в день процедуры повторить действия пункта 1. С расчетом, что прием препарата должен быть закончен минимум за 2 часа до обследования.